



### dikenkarınlı örümcek

*Gasteracantha cancriformis*



**Boy** 5-9 mm

**Özellikleri** Sirtında 2 mm uzunluğunda 6 dikenli vardır. Bu sayede kolayca yem olmaz. Zararsızdır. Dişi, 100-250 yumurta bırakır. Ağıyla, güveler ve diğer böcekleri yakalar. Ağaçlarda, çalılık alanlarda yaşar. Dişi ekim ile ocak arasında, erkekse ekim ve kasım arasında sıklıkla görülür. Tropikal bölgelerde yaşar.



### uğurböceği örümceği

*Eresus niger*



**Boy** Dişi 15-20 mm, erkek 10 mm

**Özellikleri** Yalnızca ergin erkeklerin karın bölümleri kırmızı, dişi ve yavrularınki siyahtır. Dişi, çiftleşme sonrasında toprağın içine bir tüp örür ve yumurtalarını buraya bırakır. Gündüz, içinde yumurtaların bulunduğu kozayı dışarı çıkarır, ısınmasını sağlar; gece de yerine geri koyar. Yavrular küçük boyunca tüpte kalırlar.



### karadul

*Latrodectus mactans*



**Boy** Dişi 13 mm, erkek 6 mm

**Özellikleri** Dünyadaki en zehirli örümcektir. Dişinin karının altında belirgin bir kırmızı leke bulunur. Erkek ve yavru karadullar zararsızdır. Böceklerle beslenir. Dişi bazen çiftleşme sonrası erkeği yer. Erkek karadul dişiden çok küçüktür. Fotoğrafta çiftleşen karadullar gösterilmektedir.



### şıçrayan örümcek

*Evarcha falcata*



**Boy** Dişi 7 mm, erkek 5 mm

**Özellikleri** Erkeğin vücudu koyu siyah renkli, dişinininki kahverengi ve beyazdır. Vücudu boyunca iki beyaz bant uzanır. Kuru otlaklarda, çalılıklar arasında ve ormanlık alanlarda yaşar. Adını avlanma yönteminden alır. Avlarını, üzerlerine sıçrayarak yakalar.



### dantel ağ örümceği

*Amarobius fenestralis*



**Boy** 7-12 mm

**Özellikleri** Ağı parlak mavi renklidir. Diğer örümceklerinki gibi esnek olan ağ iplikleri, gerçek boylarının 10 katına uzayabilir. Dişi örümcek yaklaşık 40 yumurta bırakır. Çoğunlukla ağaçlar üstündeki kovuklarda ve taşların altlarında saklanır.



### kuşiyen örümcek

*Therophosa blondi*



**Boy** 30 cm'ye ulaşabilir.

**Özellikleri** En büyük tarantuladır. Bacak boyu yaklaşık 21 cm'dir. Yavru örümceklerin boyları ilk yıllarda 4,5 cm'ye ulaşabilir. Büyük cırcırböcekleri, solucanlar, kertenkeleler, küçük kuşlar ve farelerle beslenir. Erkek 2-4 yıl yaşarken, dişi 12 yıl yaşayabilir. Çöl ve bozkırlarda bulunur. Türkiye'de yoktur.



### tüküren örümcek

*Scytodes thoracica*



**Boy** Dişi 4-6 mm, erkek 3-4 mm

**Özellikleri** Sarı renkli ve kahverengi beneklidir. Adını avlanma biçiminden alır. Avına 20 mm uzaklıktan yapışkan ve zehirli bir sıvı püskürtür. Böylece avını hareketsiz hale getirir, yakalar ve yer. Yavaş hareket eder. Diğer örümceklerden farklı olarak baş-göğüs bölümü karın bölümünden daha yüksektir.



### örümceklerin yapısı

*Scytodes thoracica*



### örümceklerin özellikleri

*Scytodes thoracica*

Örümceklerin hepsi etçildir ve çoğunlukla böceklerle beslenirler. Bazı örümcekler, diğer örümcek türlerini de yer. Örümceklerin bir kısmı ağ kurarak, bir kısmı da doğrudan avlarına saldırarak avlanırlar. Ağ kuranlar, ağlarının üzerinde avlarını beklerler ya da başka bir yerde saklanırlar. Ağ kurmadan avlananlar, çoğunlukla vücut renklerine benzer renkteki ortamlarda hareketsiz beklerler. Örümcekler, vücutlarındaki ve bacaklarındaki özelleşmiş tüyler sayesinde en küçük titreşimleri bile hissederler, bu da avlanmalarını sağlar. Çiftleşme bazen erkeğin ölümlüyle sonuçlanabilir. Bu, dişinin erkek örümceği av sanmasından kaynaklanır. Bazı türlerde erkek örümcekler, çiftleşme öncesi dişiyi ipeğe sardıkları bir böceği hediye ederek bu olasılığı azaltırlar. Örümceklerin ürettikleri ipek, bilinen en sağlam ipliklerdir. İpek, proteinden yapılmıştır. İpektan ağı, av yakalamak ya da yumurtaları korumak için kullanılırlar. Yumurtadan çıkan yavrular erginleşene kadar 4-12 kez deri değiştirirler. Bazı türlerde bu olay yaşam boyu sürer. Örümcekler çoğunlukla 1-2 yıl yaşarlar. Örümcek ağları, tekerlek ya da dörtgen gibi farklı biçimlerde olabilirler.