ahtapot
Octopus vulgaris

Boy 80 cm
Özellikleri Üzerinde emici vantuzlar bulunan sekiz kolu vardır. Erkeklerin bir kolu üreme organı şekline dönüşmüştür. Yengeçler, balıklar ve midyelerle beslenir. Vücut rengini değiştirerek gizlenir. Genelde geceleri etkindir.

zebra midyesi
Dreissena polymorpha

Boy 2-5 cm
Özellikleri Karadeniz ve Hazar Denizi doğal yaşam alanıdır. Ancak başka yerlerde de, doğal dengeyi bozacak derecede çoğalmıştır. Bakterilerle ve suyosunlarıyla beslenir. Besinini suyu süzerek alır. Kabuğundaki desenden dolayı zebra midyesi olarak adlandırılır.

dev midye
Tridacna gigas

Boy 150 cm
Özellikleri Ağırlığı 250 kilograma ulaşabilir. Suyosunlarıyla ortak yaşar. Bu ilişki sayesinde suyosunları tehlikelerden korunur, midye de suyosunlarının ürettiği besinle beslenir. Dünyadaki en büyük midyedir. Türkiye denizlerinde yoktur.

elisya
Elysia viridis

Boy 0,5-0,7 cm
Özellikleri Vücut rengi, beslendiği suyosunlarının rengine bağlı olarak yeşilden kırmızıya değişir. Suyosunlarının kloroplastlarını vücudunda birleştirir. Birleştirdiği kloroplastların fotosentezle ürettiği besini kullanır. Adı Latince'de "cennet türleri" anlamına gelir.

yassı tatlısı salyangozu
Planorbis planorbis

Boy Kabuğunun çapı 1,5 cm
Özellikleri Sarmal biçimli, kalın ve sert bir kabuğu vardır. Rengi kahverengidir. Genellikle, alçak bölgelerdeki durgun sularda yaşar. Bu nedenle mevsimsel göller ya da çamurlu su birikintilerinde yaşamayı yeğler.

tarak midyesi
Pecten maximus

Boy 2,5-15 cm
Özellikleri Kıyıdan itibaren 250 metre derinliğe kadar yaşayabilir. Planktonlarla beslenir. Kabuğunu hızla açıp kapayarak yarattığı su akımı sayesinde yüzer. Kirpiksi uzantılarının yardımıyla besinlerini yakalayıp ağzına doğru taşır. Türkiye denizlerinde yoktur.

dev fıçı salyangozu *Dolium galea*

Boy 15-25 cm
Özellikleri Kabuğunun rengi sarıdan kahverengiye değişir. Geceleri etkindir. Yengeçler ve denizkestaneleriyle beslenir. Salgıladığı bir asitle avının kabuğunu eritir ve yumuşak kısımlarını emer. Kendini kumun içine gömerek gizlenir.

kromodoris
Chromodoris krohni



Boy 1,5 cm
Özellikleri Pembe eflatun renginde kolaylıkla ayırdedilir. Başından solungaçlarına kadar uzanan açık sarı renkli üç şerit bulunur. Kayalık tabanlarda, karanlık yerlerde yaşar. Genellikle 10-50 metre derinlikteki bölgelerde bulunur. Süngerlerle beslenir.

uzun kollu ahtapot
Octopus macropus

Boy 150 cm
Özellikleri Gündüzleri kayalıklardaki oyukların içinde saklanarak geçirir. Geceleri avlanır. Sekiz adet olan kolları vücudunun dört katı uzunluktadır. Rahatsız edildiğinde koyu kahverengi bir sıvı püskürtür. Yengeçlerle beslenir.

kalamar
Loligo forbesi

Boy Erkek 90 cm, dişi 40 cm
Özellikleri 100-400 metre derinlikte kumlu, çamurlu tabanlarda yaşar. Yüzgeçleri nedeniyle vücudu uzun bir elmas parçasına benzer. Pembe, kırmızı ve kahverengi olur. Balıklar, kabuklular ve diğer kafadanbacaklılarla beslenir.

midye
Mytilus edulis

Boy 5-20 cm
Özellikleri İpliksi yapılarla sert yüzeylere tutunur. Kayaların üzerinde ya da çatlaklarda bir arada dururlar. Yaşam süresi 15 yıla ulaşabilir. Besinini suyu süzerek alır. Bir saatte 1,5 litre suyu süzebilir. 40 metre derinliğe kadar olan sularda yaşar.

Avrupa poliseridi
Polycera quadrilineata

Boy 4 cm
Özellikleri Akdeniz'in sığ sularında yaygındır. Vücudu saydamdır, üzerinde beş sıra sarımsı benek bulunur. Bazıları siyah benekli ya da tümüyle siyah vücutlu olabilir. Başının ön tarafında dört, sırtında da onbir uzantı vardır. Genellikle bir arada dururlar.

bağ salyangozu
Helix pomatia

Boy Kabuğun çapı 4,5-5 cm
Özellikleri Büyük bir salyangozdur. Kabuğunun alt kısmı kızılımsı sarı renktedir. Dişi, temmuz-eylül ayları arasında yumurtlar. Genelde 1000-1500 metre yüksekliklerdeki bölgelerde yaşar. Üzüm bağlarında çok sık rastlandığından bu ad verilmiştir.

kelebek midyesi
Donax variabilis

Boy 1,5-2,5 cm
Özellikleri Kabuğu değişik renklerde olabilir. Kıyılarda bulunur. Çünkü bu bölge dalga hareketleri nedeniyle oksijen ve besin açısından zengindir. Dalgalarla sürüklenmemek için, ayağını kullanarak kendini kuma gömer. Türkiye denizlerinde yoktur.

çizgili kiton
Tonicella lineata



Boy 5 cm
Özellikleri Pembe renklidir ve bu sayede kayaların üzerini kaplayan mercan rengindeki suyosunları arasında gizlenir. Suyosunları ve kabuklular üzerinden beslenir. Vücudu sekiz bölmelidir. Tehlikedeyken kıvrılarak top haline gelir. Türkiye denizlerinde yoktur.

flabelina
Flabellina affinis

Boy 4 cm
Özellikleri Başının üzerinde iki uzantı bulunur. Saydam bir vücudu olduğundan sindirim sistemi dışından görülebilir. Besinleri arasında zehirli hidra türleri vardır. Bunların zehirinden etkilenmediği gibi, zehiri vücudunda biriktirerek kendini savunmada kullanır.

lale salyangozu
Fasciolaria tulipa

Boy 7-20 cm
Özellikleri Diğer salyangozlar ve istiridyelerle beslenir. Deniz tabanında yaşar. Kabuğunun üzerinde kahverengi ve beyaz çizgiler bulunur. Ayağını kullanarak kendini öne iter ve sıçrama benzeri bir hareketle yavaşça ilerler. Türkiye denizlerinde yoktur.

lomanotus
Lomanotus genei



Boy 6 cm
Özellikleri Vücudu genellikle saydamdır. Bu türün en belirgin özelliği, vücudunu çevreleyen fırfır benzeri sarı uzantılarıdır. Bazı hidra türleriyle beslenir. Yaşam alanı 90 metre derinliğe kadar yayılır. Çok sık karşılaşılabilen bir canlı değildir. Türkiye denizlerinde yoktur.

küçük boynuz
Spirula spirula

Boy Sarmal kabuğun uzunluğu 4,5 cm
Özellikleri Çoğunlukla başaşağı durur. Gündüz derine iner. Kabuğundaki odacıklarda bulunan hava sayesinde değişik derinliklere dalar. Baş ve kolları tamamen kabuğun içinde durur. Avlanırken sekiz kolu ve iki dokunacını dışarı çıkarır. Türkiye denizlerinde yoktur.

deniz tavşanı
Aplysia fasciata

Boy 30-40 cm
Özellikleri Çift cinsiyetlidir, yani her biney hem dişi hem de erkek özelliklerini taşır. Ağırlığı neredeyse 2 kg'dır. Vücudu beneklidir. Gündüzleri kayalarda hareketsiz durur, geceleriye yüzer. Adını tavşan kulağına benzeyen dokunaçlarından alır.

mürekkepbalığı
Sepia officinalis

Boy Erkek 60 cm boyunda, dişi daha kısadır.
Özellikleri Tehlikedeyken çok hızlı renk değiştirerek gizlenir. Ayrıca kur yaparken de renk değiştirir. Rahatsız edildiğinde, dışarıya mürekkep benzeri bir sıvı püskürtür. Kendini kuma ya da çamura gömer. Balık, yengeç ve karideslerle beslenir.

notilus
Nautilus pompilus

Boy Kabuğunun çapı 25 cm
Özellikleri Kafadanbacaklıların kabuklu son üyesidir. Çok ağır hareket eder ve gözlerinde mercek yoktur. Kabuklarının içindeki hava sayesinde farklı derinliklere dalar. Bu cinsin üyeleri 500 milyon yıldır dünya okyanuslarında yaşamaktalar. Türkiye denizlerinde yoktur.

benekli dorid
Discodoris atromaculata

Boy 2-10 cm
Özellikleri Süngerlerle beslenir. Bu nedenle süngerlerin bol olduğu yerlerde yaşar. Vücut rengi beyazdır, üzerinde kahverengi ya da siyah benekler bulunur. Bu sayede gizlenir. Akdeniz'e özgü bir hayvandır. Çoğunlukla küçük mağara ve oyuklarda bulunur.

İskoç denizsümüklüböceği
Janolus cristatus



Boy 8 cm
Özellikleri Bu saydam vücutlu canlının çok sayıda renkli uzantısı vardır. Yosunhayvancıklarıyla beslenir. Çift cinsiyetlidir. Yumurtalarını paket benzeri bir yapı içerisinde bırakır. Bu paketler boncuk gibi görünür. Türkiye denizlerinde yoktur.

pembehallalı salyangoz
Calliostoma annulatum

Boy 2-3 cm
Özellikleri Küçük omurgasızlarla ve suyosunlarıyla beslenir. Sığ sulardan başlayarak 20 metre derinliğe kadar yaşar. Altın renkli kabuğunun üzerindeki pembe çizgileri nedeniyle çok dikkat çekicidir. Türkiye denizlerinde yoktur.

yumuşakçalar

Yumuşakçalar çok geniş bir canlı grubudur. Bu canlılar birbirlerinden çok farklı yapısal özelliklere sahiptir.



yumuşakçaların özellikleri

Yumuşakçalar denizlerden göllere, dağlık bölgelerden ormanlara kadar farklı birçok ortamda bulunurlar. Yumuşakçalar şubesinde kafadanbacaklılar, karındanbacaklılar, midyeler ve kitonlar gibi ilginç canlı grupları yer alır. Yumuşakçaların tümünün ortak özelliği vücutlarında "mantoo" denilen deri benzeri bir organın bulunmasıdır. Mantoo, iç organları çevreler. Birçok yumuşakça türünde bulunan kabuk, mantoo tarafından salgılanır. Yumuşakçaların kabukları kalsiyum karbonattan oluşur. Bazı türlerdeyse kabuk yoktur. Yumuşakçaların çoğunda mantonun içerisinde bir dizi solungaç bulunur. Bu solungaçlar sayesinde canlılar sudan oksijen alırlar. Yumuşakçaların bir başka özelliği de ağızda bulunan ve kayaların üzerindeki bitkileri kazıyarak yutmaya yarayan "radula" adındaki törpü biçimli yapıdır. Yumuşakça sınıflarından biri olan midyeler, dünya üzerinde "inci" yapabilen tek canlı grubudur. İnci, mantonun içerisine giren kum tanesi gibi yabancı bir maddenin sedefle kaplanması sonucunda oluşur.