


Bu Hayvanlar Zehirli



Bazı hayvanlar, avlarını etkisiz hale getirmek ya da kendilerini tehlikelere karşı korumak için zehir salgılar. Bazısı ısırarak, bazısı zehirli iğnesini kullanarak, bazısı da derisine dokunulduğunda zehrini aktarır. İşte zehirli olmalarıyla bilinen bazı hayvanlar...



Çilek ok zehri kurbağası

Orta Amerika yerlileri çilek ok zehri kurbağasının zehrini oklarının ucuna sürerek başka hayvanları avlamakta kullanırlarmış. Adını buradan alan çilek ok zehri kurbağası, çoğunlukla Orta Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşar. Zehir kurbağanın derisinde bulunur. Bu zehriyle onu avlamak isteyen avcıyı felç eder ve böylece ondan kurtulur. Çilek ok zehri kurbağasının zehirli olmasının nedeninin zehirli karıncalarla ve böceklerle beslenmesi olduğu düşünülüyor.



Kara mamba

Güney Afrika'da yaşayan kara mamba, dünyanın en zehirli ve en hızlı yılanlarından biri. Bu yılan adını derisinin renginden değil, ağzının içinin siyah oluşundan almıştır. Kara mamba kendisini tehlike altında hissettiğinde ya da avlanmak istediğinde vücudunun ön bölümünü dikleştirir ve saldırır. Bir canlıyı ısırıldığında zehir dişlerinden zehrini akıtır. Isırdıktan sonra geri çekilerek canlının zehirden etkilenmesini bekler. Doğadaki en etkili zehirlerden biri olan bu zehir, ısırılan canlının sinir sistemine etki ederek felç olmasına ve ölmesine neden olabilir.



Resif taş balığı

Resif taş balığı dünyadaki en zehirli balıklardan biri. Büyük Okyanus'un ve Hint Okyanusu'nun sığ sularında ve Kızıldeniz'de yaşayan resif taş balığı hareketsiz durduğunda bir taşla benzer. Bu özelliği sayesinde deniz tabanında zor fark edilir. Bu balık tehlike anında ya da üzerine basıldığında sırtındaki yüzgecinde bulunan dikenlerden zehir salgılar. Zehre maruz kalan canlı büyük bir acı hisseder, felç olabilir ve solunum yapamaz.



Dijitalizasyon / Alamy

Kutu denizanası

Kutu denizanası Avustralya'nın ve Yeni Gine'nin kuzey kıyılarından Filipinler'in ve Vietnam'ın kuzeyine kadar olan bölgelerde yaşar. Yarı saydam olan kutu denizanası, adını kutuya benzeyen şeklinden almıştır. Kutu denizanası bilinen en zehirli denizanası türlerinden biridir. Dokunaçlarında bulunan zehir kapsülleri bir canlıyla temas ettiği anda patlar. Bu zehir kuvvetli bir acıya ve yanma hissine neden olur. Zehir dolaşım sistemlerini etkileyerek bazı hayvanların ölümüne neden olabilir.



Digitaling / Alamy

Tekstil deniz salyangozu

Tekstil deniz salyangozu zehirli bir deniz salyangozu türüdür. Adını üzerindeki desenden almıştır. Hint Okyanusu'nun, Büyük Okyanus'un ve Atlas Okyanusu'nun belirli bölgelerinde ve ayrıca Kızıldeniz'de yaşar. Tekstil deniz salyangozunun zehrini akıttığı bir iğnesi vardır. Bu iğnesini avlanmak ya da kendini savunmak için kullanır. Zehri avıntı felç edebilecek kadar güçlüdür. Bu salyangozun zehrindeki bazı maddeler ağır kesici ilaçların hammaddesi olarak kullanılır.




Digitaling / Alamy



Büyük mavi halkalı ahtapot

Büyük mavi halkalı ahtapot, Büyük Okyanus'un batısındaki tropikal bölgelerde yaşar. Adını, üzerinde tehlike anında parlak mavi halkalar belirmesinden almıştır. Büyük mavi halkalı ahtapotun salgı bezlerinde bulunan bakteriler sayesinde zehir ürettiği biliniyor. Ahtapot, zehrini küçük deniz canlılarını avlamak ve kendisini savunmak için salgılar. Ahtapotun ısırığı pek acı vermez ancak yayılan zehir kısa sürede ısırıldığı canlının solunumunu durdurabilir.



Siyah karınlı Brezilya göçmen örümceği

Siyah karınlı Brezilya göçmen örümceği Güney Amerika'da yaşayan zehirli bir örümcek türüdür. Bu örümcek ağ örmek yerine ormanda gezinmeyi tercih eder. Adını da bu özelliğinden almıştır. Örümcek kendisini tehlikede hissettiğinde ısırabilir. Bu ısırıkla vücudundaki zehir, ısırıldığı canlıya geçer ve büyük bir acıya neden olur. Zehir, kasların çalışmasını ve solunumu durdurarak bazı hayvanları öldürebilir.

Tepeli pitohui kuşu

Tepeli pitohui kuşu Yeni Gine’de yaşayan bir kuş türüdür. Tepeli adını, başındaki hafif kabarık tüylerinden dolayı almıştır. Derisi ve tüyleri zehirlidir. Tepeli pitohui kuşunun zehri, ok zehri kurbağalarının zehriyle aynı özellikleri taşır ama onlarınkine kadar güçlü değildir. Zehri uyuşmaya ve acıya neden olur. Tepeli pitohui kuşunun zehrini yediği zehirli böceklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Tim Laman / National Geographic



Borneo yavaş lorisi

Borneo Adası’nda yaşayan Borneo yavaş lorisi, adından da anlaşılabilir gibi yavaş hareket eden bir hayvandır. Borneo yavaş lorisi bilinen tek zehirli primat cinsine ait bir türdür. Koltukaltında bulunan salgı bezlerinde üretilen bir madde, tükürüğüyle birleştğinde zehirli hale gelir. Savunma amacıyla ısırıldığında bu zehir ısırılan canlıya geçer. Zehir acı verir, bazen de alerjik reaksiyonlara neden olur.

Djifedma / Alamy